درمان

✓درمان بیماری اولیه مانند بیماری های التهابی، بدخیمی ها، افزایش حساسیت بدن یا بیماری های متابولیک مانند بیماری های کلیوی

✓داروهای ضد التهابی مانند ایبوبروفن، آسپیرین و کورتونها و داروی کلشی سین

✓تخلیه مایع اضافی به وسیله سر سوزن (پریکاردیوسنتز) (در موارد مقاوم به درمان)

✓جراحی از طریق برداشتن پریکارد (در موارد مقاوم به درمان)

✓جراحی از طریق تخلیه پریکارد احشایی و جداری (در موارد مقاوم به درمان)

داروها

دارودرمانی از طریق داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی، ضددردها، آنتی بیوتیکها و استروئیدها انجام میشود.

در مورد داروی کلشی سین: باید به مدت ۳ ماه استفاده کنید و هر هفته تا زمان نرمال شدن جواب آزمایشات التهابی به پزشک معالج مراجعه نمایید.

با یاد داشته باشید:

- ✓ طبق نظر پزشک معالج و تا زمان نرمال شدن جواب آزمایشات از ورزش های سنگین و رقابتی اجتناب کنید.
- ✓ همچنین به دلیل مصرف داروهای رقیق کننده خون و کورتون خطر خونریزی دارید، بنابراین باید از نظر خونریزی، ضربه و آسیب مراقبت کافی داشته باشید.

در چه شرایطی به پزشک مراجعه نمایید؟

✓عود علائم بیماری

✓درد سینه

✓تب

✓کوتاهی نفس

✓علائم سرما خوردگی

✓ در صورت مشاهده هرگونه علائم نگران کننده دیگر.




در صورت داشتن سوال در منزل، از ساعت ۱۴-۸ با شماره تلفن همراه پرستار پیگیر ۰۹۹۶۰۶۹۶۸۵۲ تماس بگیرید.

(همه روزه به غیر از ایام تعطیل)

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

بیمارستان رحیمیان

پریکاردیت



www.payamesalamat.com

واحد آموزش سلامت

خرداد ماه سال ۱۴۰۵

تحت نظارت سرکار خانم دکتر عبدالکریمی

پریکاردیت

به التهاب لایه ی خارجی قلب پریکاردیت گفته میشود.

شایع ترین بیماری پریکارد قلب، التهاب پریکارد یا "پریکاردیت" (Pericarditis) است. التهاب در لایه پریکارد موجب ضخیم شدن لایه های پریکارد، ساییده شدن دو لایه به یکدیگر و افزایش مایع بین دو لایه پریکارد می گردد.

علائم

✓درد تیز و ناگهانی قفسه سینه که به شانه، پشت و بازو انتشار میابد .

✓دردی که با دراز کشیدن، سرفه کردن و دم بدتر شده و با نشستن و خم شدن به طرف جلو تسکین پیدا میکند .

✓تب و لرز

✓خستگی و ضعف

✓تنفس کوتاه

✓ اضطراب



علل شایع

✓ عوامل ناشناخته (شایع ترین علت)

✓عفونت باکتریایی، ویروسی و قارچی

✓سکته قلبی

✓آسیب های ناشی از جراحی

✓سل

✓تومورها

✓داروها


✓اشعه

✓بیماری های متابولیک مانند نارسایی کلیه

✓ضربه شدید به قفسه سینه

✓عفونت با HIV

✓بیماریهای خود ایمنی مانند لوپوس.



عوارض احتمالی

✓تجمع مایع اطراف قلب (افیوژن پریکارد)

✓تجمع مایعی تشکیل شده از خون، لخته های خونی، چرک و گاز در اطراف قلب (تامپوناد قلبی)

✓تنگی نفس

تشخیص

تشخیص توسط پزشک با اخذ شرح حال و معاینه دقیق بیمار صورت میپذیرد.

در صورت نیاز از دیگر روشهای تشخیصی از جمله موارد زیر استفاده میشود:

✓تستهای خونی

✓الکتروکاردیوگرام یا نوار قلب

✓اکوکاردیوگرام

✓ عکسبرداری از قفسه سینه